

ASPECTE PARTICULARE ÎN TUMORILE GASTRICE

D. HORȘIA¹, Z. POPOVICI²¹Doctorand Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, ²Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Cuvinte cheie:
neoplasm gastric,
tumori nonepiteliale

Rezumat: Neoplasmul gastric și tumorile nonepiteliale sunt formațiuni frecvent întâlnite la nivelul stomacului. Scopul studiului este de a evalua comparativ aspecte legate de morbiditate și mortalitate în cazul celor două entități maligne. Material și metodă: studiu descriptiv retrospectiv, pe o perioadă de aproximativ 40 ani, pe un lot format din 116 pacienți diagnosticați cu neoplazii gastrice (38 cazuri), respectiv tumori nonepiteliale (78 cazuri). Concluziile cercetării evidențiază faptul că evoluția și rata vindecărilor a fost superioară în cazul bolnavilor cu tumori nonepiteliale (83% versus 79%), în timp ce ponderea deceselor a fost mai scăzută în cazul neoplasmelor gastrice (5% versus 10%).

Keywords: gastric neoplasm, nonepithelial tumours

Abstract: Gastric neoplasm and nonepithelial tumours are commonly found at stomach level. The objective of the study is to evaluate comparatively certain aspects related to morbidity and mortality. Material and method: descriptive retrospective study over a period of almost 40 years, on a sample of 116 patients with the diagnosis of gastric cancer (38 cases), respectively of nonepithelial tumours (78 cases). The conclusions of the research show that the evolution and healing rate was favourable for the patients with nonepithelial tumours (83% versus 79%), while the percentage of deaths was lower in the cases of gastric neoplasms (5% versus 10%).

INTRODUCERE

Neoplasmul gastric este o afecțiune malignă, în care celulele neoplazice apar inițial la nivelul mucoasei gastrice, iar apoi se extind dincolo de peretele stomacului în țesuturile învecinate. Tipul histologic cel mai frecvent este adenocarcinomul, reprezentând aproximativ 95% din totalul cancerelor gastrice. Neoplasmul nonepitelial reprezintă o entitate mai recentă, din care fac parte tumorile stromale gastrointestinale, schwannoamele sau tumorile cu celule granulare.

SCOP

Lucrarea de față își propune să evalueze comparativ aspecte legate de morbiditate și mortalitate în neoplasmul gastric, respectiv tumorile nonepiteliale.

MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU

Am realizat un studiu descriptiv retrospectiv pe un lot de 116 pacienți, din care 38 cazuri neoplazii gastrice și 78 cazuri tumori nonepiteliale. Cele două categorii de pacienți au fost analizate comparativ sub aspectul ratelor de morbiditate și mortalitate.


REZULTATE

Pentru diagnosticul histopatologic, am luat în considerare cinci grade de adenocarcinom. Procentul major este reprezentat de adenocarcinoamele gradul II și III de malignitate, reprezentând aproximativ 84% din totalul cazurilor.

Adenocarcinoamele situate la granița dintre stadiul II și III apar în proporție de 3%, în timp ce „extremele” (Gradul I și IV de malignitate) apar în procent de 13%.

Analiza procentuală a dispersiei în tumorile nonepiteliale demonstrează o frecvență crescută a limfoamelor (21%), reticulosarcomelor (19%), schwannoamelor (15%). Cea de-a patra categorie, ce cuprinde leomioamele și rabdomioamele, este de asemenea, bine reprezentată (13%).

Figura nr. 1. Diagnosticul histopatologic în neoplasmul gastric (Dispersia procentuală)




Dispersia procentuală în cazul neoplasmelor gastrice ne indică o evoluție postoperatorie favorabilă și o rată crescută a celor vindecați chirurgical (79%) sau ameliorați (11%). Cea de-a treia categorie, a externărilor agravate, reprezintă 5%, în timp ce restul pacienților (5%) au decedat în urma complicațiilor postoperatorii.

¹Autor Corespondent: D. Horșia, Secția Anatomie Patologică, Bd. C. Coposu, Nr. 2-4, Sibiu, România, e-mail: dragos_horsia@yahoo.com, tel: 0728909154.


Articol intrat în redacție în 23.08.2011 și acceptat spre publicare în 25.01.2012
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Iunie 2012; 2(2):30-31

Figura nr. 2. Diagnosticul histopatologic în tumorile nonepiteliale (Dispersia procentuală)




Ca și în cazul neoplasmelor gastrice, un procent însemnat dintre pacienții luați în considerare în acest studiu au prezentat o evoluție postoperatorie favorabilă fiind vindecați chirurgical (83%) sau ameliorați (7%), alții decedând în urma complicațiilor postoperatorii apărute (10%).

Figura nr. 3. Starea la ieșire (Dispersia procentuală în neoplasmelor gastrice)



Categoriile de vârstă interesate sunt: 50-59 ani și 60-69 ani în neoplasmelor gastrice și 50-59 ani în tumorile nonepiteliale

Figura nr. 4. Starea la ieșire (Dispersia procentuală în tumorile nonepiteliale)



CONCLUZII

Analiza noastră confirmă importanța cunoașterii și descoperirii celor două categorii mari de neoplasme în stadii incipiente.

BIBLIOGRAFIE

1. Alberts RS, Goldberg RM. Gastrointestinal tract cancers. In: Casciato DA, editor. Manual of clinical oncology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2004. p. 185-195.
2. Gunderson LL, Donohue JH, Alberts SR. Cancer of the stomach. In: Abeloff MD, editor. Clinical oncology. 3rd ed. New York: Elsevier Churchill Livingstone; 2004. p. 1819-1862.
3. Bonin SR, Roderich E, Schwartz RE. Gastric cancer. In: Pazdur R, editor. Cancer management: a multidisciplinary approach. 7th ed. New York: CMP; 2004. p. 259-271.
4. Pister PWT, Kelsen DP, Powell SM et al. Cancer of the stomach. In: DeVita VT Jr., Hellman S, Rosenberg SA, editors. Cancer - principles & practice of oncology. 7th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2005. p. 909-944.
5. Andrei S, Andrei A, Tonea A, Andronesi D, Becheanu G, Dumbrava M, et al. Factori de risc în evoluția malignă a tumorilor gastrointestinale stromale. Chirurgia. 2007;102(6):641-650.